













Compte-rendu de la 2^{ème} sortie Mycologique Vernaison le 10/04/2021 - L'île de la Table Ronde



Nous étions une petite vingtaine, des anciens et surtout des nouveaux, à tenter de débusquer la très recherchée **Morille** (*Morchella esculenta*). Dans le respect des mesures sanitaires, nous avons fait 4 groupes de 6 personnes. Sans pluie depuis plusieurs semaines, c'est quand même trois petites Morilles qui ont été trouvées (par Daniel JUNIQUE), ainsi que quelques autres espèces qui nous ont permis de refaire fonctionner nos neurones mycologiques ... Elles sont là Pour l'omelette.



Les comestibles ...			
<p style="text-align: center;">Morchella esculenta</p>  <p>En forme de cervelle, ochracé, gris brun, cendré, alvéoles irrégulières, pied ochracé, creux, attaché à la base du chapeau, chair blanchâtre, grisâtre, feuillus, frênes, Toxique cru ou mal cuite</p>	<p style="text-align: center;">Lepista nuda</p>  <p>Hygrophane, lilacin violet, brunissant, sporée rosâtre, marge enroulée, lames lilas, séparables, pied floconneux au sommet, violet pâle, odeur de pharmacie, forêts, bords de chemins</p>	<p style="text-align: center;">Cyclocybe cylindracea</p>  <p>Pholiote du peuplier, Ch. brun-crème, ochracé-roux, craquelé, L. brun-cannelle, P. concolore, anneau ample, brunissant, odeur fruitée, en touffes feuillus, peupliers, = <i>Agrocybe aegerita</i></p>	<p style="text-align: center;">Disciotis venosa</p>  <p>Pezize veinée, en coupe, lobé, ondulé, plissé, veiné, brun fauve, brun sombre, couleur bai, extérieur crème-ochracé, chair cassante, odeur de chlore, feuillus, herbe, pré-bois, ruisseaux</p>
Les autres, pour la science ...			
<p style="text-align: center;">Fomes fomentarius</p>  <p>Amadouvier, en sabot, zoné, brun-gris, brun foncé, brun ochracé, beige, blanchâtre avec l'âge, pores fins crème brunâtre au toucher, sur feuillus, se carbonise à la flamme</p>	<p style="text-align: center;">Ganoderma applanatum</p>  <p>En console, aplati, couleur terreuse, brun-noisette, gris-brun, chocolat, concentrique, bosselé, marge blanche, pores blanchâtres, brun au toucher, tronc de feuillus</p>	<p style="text-align: center;">Daedaleopsis tricolor</p>  <p>Tramète rougissante, en éventail, aplati, zoné, brun-clair brun rouge, pores allongés, lamelliformes, amples, coriaces brun vineux au toucher, sur bois mort de feuillus = <i>Daedalea confragosa</i> var. <i>tricolor</i></p>	<p style="text-align: center;">Cellulariella warnieri</p>  <p>= <i>Lenzites warnieri</i>, en éventail, aplati, crème, grisâtre, rugueux, granuleux au centre, hyménium lamelliforme, pores brun, jaunâtres, coriaces, sur bois mort de feuillus</p>
<p style="text-align: center;">Schizophyllum commune</p>  <p>En éventail, laineux, hirsute, gris blanchâtre, +/- verdi par les algues, pores lamelliformes, allongés beige-rosâtre, sur bois mort de feuillus.</p>	<p style="text-align: center;">Auricularia mesenterica</p>  <p>Gélatineux, hérissé de poils blanchâtres, zoné, gris-clair, gris-brun, verdâtre, hyménium veiné, ochracé, brun-pourpré, sur troncs de bois morts de feuillus</p>	<p style="text-align: center;">Leucoagaricus barssii</p>  <p>Lépiote radicante ou proche Leucoagaricus leucothites Lépiote pudique</p>	<p style="text-align: center;">Lyophyllum decastes</p>  <p>Elastique, caoutchouteux, gris, gris brun, brun ochracé, lames grisâtre, pied blanchâtre, ochracé, le plus souvent en touffes, ou isolé, feuillus</p>

➤ Plus de vieux « *Coprinus comatus* » en mauvais état et surtout tout desséchés !!!